

工業用防腐防カビ剤

サンアイゾール 200 48%DISP**(San-ai zol 200 48% Dispersion)**

サンアイゾール 200 48%DISPは熱的に安定なピリジン系化合物を使いやすい分散タイプにした薬剤で、広範囲の微生物に効果があります。また、フケ取シャンプーにて添加している成分と同等であり安全性の高い薬剤で、近年、様々な分野にて使用されております。

【性状】

外 観：灰白色～淡黄色水分散剤

活性成分：①ピリジン系化合物

比 重：データなし

pH(5wt%)：7.5(20℃)

粘 度：データなし

耐 熱 性：①240℃(分解)

溶 解 性：水に難溶

使用pH域：4～8で安定

【安全性】急性経口毒性：①LD₅₀=>560mg/kg(ラット)急性経皮毒性：①LD₅₀=>2,000mg/kg(ラット)急性吸入毒性：①LD₅₀(4hr)=5.1mg/L(ラット)

皮膚刺激性：有り

魚 毒 性：①LC₅₀(96hrs)=0.003ppm(ニジマス)①LC₅₀(96hrs)=0.01ppm(Bluegill sunfish)

変 異 原 性：①Ames試験陰性

B O D：データなし

C O D：データなし

下水システムへの影響：データなし

【適用法規】

化学物質管理監督法(PRTTR)：第一種指定化学物質 該当

労働安全衛生法：非該当

消防法危険物：非該当

毒劇物取締法：非該当

【用途】(単位：ppm, mg/kg)

各種塗料の抗菌防カビ	500～5,000
尿尿処理物の悪臭防止	500～5,000
スポンジなどの抗菌防カビ	500～3,000
空調フィルターの抗菌防カビ	1,000～5,000
各種紙、不織布製品の抗菌防カビ	1,000～5,000

【抗菌力】最小発育阻止濃度（MIC）

細菌	<i>Bacillus subtilis</i>	50
	<i>Escherichia coli</i>	50
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	>1,600
	<i>Staphylococcus aureus</i>	12.5
カビ	<i>Alternaria arternata</i>	6.25
	<i>Aspergillus niger</i>	25
	<i>Chaetomium globosum</i>	50
	<i>Cladosporium cladosporioides</i>	12.5
	<i>Fusarium moniliforme</i>	6.25
	<i>Penicillium citrinum</i>	50
	<i>Trichoderma viride</i>	50

* 日本化学療法学会～寒天平板法に基づいた評価 [μ g/ml]

* () 内数字は、他文献値

【取扱い保管上の注意】

- ・本品は刺激性を有しますので、取扱いの際には保護眼鏡、ゴム手袋などの保護具を着用して下さい。
- ・保管にあたっては、直射日光を避け、室温に保管して下さい。
- ・経時変化は、ほとんどありませんが、水分が入らないように密栓して保管して下さい。

【販売部門】

三愛オブリ株式会社

化学品事業部 化学品部

〒100-8154 東京都千代田区大手町2-3-2（大手町プレイス イーストタワー10階）

TEL：03-6880-3107 FAX：03-6880-3031

東日本化学品第一販売支店 / 東日本化学品第二販売支店

〒140-8539 東京都品川区東大井5-22-5（オブリ・ユニビル7階）

TEL：03-6864-1825 FAX：03-6864-1830

西日本化学品販売支店

〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-1-4（千里中央ツインビル別館2階）

TEL：06-6871-8500 FAX：06-6871-8510

西日本化学品販売支店(九州)

〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町5-32（オーシャン博多ビル3階）

TEL：092-272-1113 FAX：092-272-1140

中部化学品販売支店

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵2-12-1（ナカノビル5階）

TEL：052-930-5303 FAX：052-930-5304

更新日：2023.04